

8

Πώς χρηματοδοτείται η έρευνα για τον παγκρεατικό καρκίνο;

► Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 42 εκατ. στερελίνες επενδύονται στην έρευνα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, ενώ στην έρευνα για τον παγκρεατικό καρκίνο κατανέμονται 5,2 εκατ. στερελίνες⁷.

► Αν και ο καρκίνος του παγκρέατος είναι το **4ο αίτιο θανάτου από καρκίνο**, στην έρευνα για τον καρκίνο του παγκρέατος κατανέμεται λιγότερο από το 2% της συνολικής χρηματοδότησης για την έρευνα του καρκίνου στην Ευρώπη⁶.

Eίναι αναγκαία η εξεύρεση επιπλέον πηγών χρηματοδότησης για τον παγκρεατικό καρκίνο.

9

Ποια είναι η κατάσταση σχετικά με τον παγκρεατικό καρκίνο σε σύγκριση με τους άλλους καρκίνους;

Παρότι ο καρκίνος του παγκρέατος είναι το **4ο αίτιο θανάτου από καρκίνο**, δεν υπάρχει καμία αναφορά του ειδικού βάρους του ή κάποια πολιτική σχετική με αυτόν στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον «Προσυμπτωματικό Ελεγχο για τον Καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση» που καταρτίστηκε το 2014.

► Ενώ, το 2012, αντιπροσώπευε το **16,8%** της θνησιμότητας των πιο θανατηφόρων καρκίνων, **ο καρκίνος του παγκρέατος** αντιστοιχούσε μόνο στο **3,4%** των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περίοδο 2009-2014 για αυτούς τους καρκίνους.

► Την περίοδο 1975 - 2011, η επίπτωση και η θνησιμότητα του καρκίνου του μαστού **μειώθηκαν κατά 43%**, λόγω της υιοθέτησης του μαστογραφικού προσυμπτωματικού ελέγχου και των βελτιώσεων στη θεραπεία⁸.

Υπάρχει απόκλιση μεταξύ της σοβαρότητας και της θνησιμότητας της νόσου και της πολιτικής προτεραιότητας που δίνεται σε αυτή.

10

Πώς μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

► Η βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης εξαρτάται από την καλύτερη κατανόηση της νόσου, που αυξάνει τη δυνατότητα πιο πρώιμης διάγνωσης.

► Το Νοέμβριο του 2014, δημιουργήθηκε μια Ευρωπαϊκή Πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τον καρκίνο του παγκρέατος (European Multi-Stakeholder platform on Pancreatic cancer). Αποτελείται από ειδικούς, ακαδημαϊκούς, ασθενείς, κλινικούς γιατρούς και φορείς χάραξης πολιτικής, οι οποίοι δεσμεύθηκαν στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του παγκρέατος, με σκοπό τη βελτίωση της περίθαλψης, της διάγνωσης και της συλλογής δεδομένων για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του παγκρέατος σε όλη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα χρηματοδοτείται από τις εταιρείες Celgene και Baxalta.



10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τον παγκρεατικό καρκίνο

10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τον παγκρεατικό καρκίνο

1

Τι είναι ο καρκίνος του παγκρέατος;

► Ο καρκίνος του παγκρέατος εμφανίζεται όταν κακοήθη κύτταρα στο πάγκρεας, ένα αδενικό όργανο που βρίσκεται πίσω από το στομάχι, αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και να σχηματίζουν μία μάζα.

► Έχει το χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης από όλους τους καρκίνους.

► Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι σήμερα το **4ο αίτιο θανάτου από καρκίνο** στην Ευρώπη. Αν δεν ληφθούν μέτρα, εκτιμάται πως θα γίνει το **2ο αίτιο θανάτου από καρκίνο**.



3

Ποιοι κινδυνεύουν;

► Ο καρκίνος του παγκρέατος προσβάλλει εξίσου τους άνδρες και τις γυναίκες.

► Η **παχυσαρκία** αυξάνει τον κίνδυνο σε ποσοστό περίπου **12%** όλων των καρκίνων του παγκρέατος⁵.

► Μόνο το **20%** όλων των περιπτώσεων παγκρεατικού καρκίνου είναι εγχειρήσιμο³. Η καθυστερημένη διάγνωση αποτελεί την κύρια αιτία της αδυναμίας ίσασης των ασθενών.

► Έχει το **χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης** από όλους τους καρκίνους. Οι ασθενείς που προσβάλλονται από παγκρεατικό καρκίνο χάνουν **το 98% του προσδόκιμου υγιούς ζωής τους** τη στιγμή της διάγνωσης².

Σήμερα, η διάγνωση του παγκρεατικού καρκίνου, σε γενικές γραμμές, ισοδυναμεί με πολύ κακή πρόγνωση και λίγοι ασθενείς παραμένουν εν ζωή ένα χρόνο μετά τη διάγνωση⁴, ενώ μία πιο πρώιμη διάγνωση θα μπορούσε να μειώσει τη θνητότητα της νόσου. Εάν η διάγνωση γίνεται εγκαίρως, οι πιθανότητες επιβίωσης αυξάνονται.

► Η χρόνια παγκρεατίτιδα προκαλείται συνήθως από μακροχρόνια **κατανάλωση αλκοόλ**.

► Το **κάπνισμα** σχετίζεται με το 1/3 περίπου των περιπτώσεων⁵.

► Η **ηλικία** είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του παγκρέατος. Η επίπτωσή του αυξάνεται μετά την ηλικία των 45 ετών.

► Τα άτομα που πάσχουν από **διαβήτη** παρουσιάζουν διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης παγκρεατικού καρκίνου⁵.

2

Πόσο σοβαρή είναι η νόσος;

► Λόγω του σοβαρού προβλήματος υποδιάγνωσης, η συνολική μέση επιβίωση ενάς ατόμου που έχει διαγνωστεί με μεταστατικό παγκρεατικό καρκίνο είναι **4,6 μήνες²**.

► Έχει το **χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης** από όλους τους καρκίνους. Οι ασθενείς που προσβάλλονται από παγκρεατικό καρκίνο χάνουν **το 98% του προσδόκιμου υγιούς ζωής τους** τη στιγμή της διάγνωσης².

4

Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα;


Nauτία

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Άλλαγές στις εντερικές συνήθειες: στεατόρροια

Άλλαγές στις εντερικές συνήθειες: διάρροια

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση



5

Πώς γίνεται η διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος;

► Επίσκεψη στον παθολόγο
► παραπομπή σε ειδικό γιατρό
► εξετάσεις και διερεύνηση (εξετάσεις αιματος, υπερηχογράφημα και ακτινογραφικές εξετάσεις, βιοψία)

► Στο 40% των ασθενών που διαγιγνώσκονται, το στάδιο της νόσου είναι προχωρημένο και ο καρκίνος είναι ήδη μεταστατικός.

► Λόγω της έλλειψης αναγνωρισμένων βιοδεικτών, γονιδιών ή πρότυπων απεικονιστικών χαρακτηριστικών, η διάγνωση είναι δύσκολη.

6

Ποια είναι τα πρότυπα της θεραπείας;

► Χειρουργική επέμβαση
► Ανοσο-ενισχυτική χημειοθεραπεία

Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από τα στάδια του όγκου. Μπορεί να είναι:

► Παρηγορητική και υποστηρικτική θεραπεία

► Λόγω της καθυστέρησης στη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας, τα ποσοστά επιβίωσης στον καρκίνο του παγκρέατος δεν έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 40 χρόνια. Εξαιτίας της χαμηλής χρηματοδότησης στον τομέα της έρευνας, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις νέες θεραπείες.

7

Έχει γίνει κάποια πρόοδος στη συγκεκριμένη νόσο τα τελευταία χρόνια;